

Hinweise zur Aufbewahrung der Takhzyro®-Fertigspritze



Um Ihr Medikament sicher aufzubewahren, sollten Sie unbedingt folgende Hinweise beachten:

- + Bewahren Sie Takhzyro bei 2 °C bis 8 °C im Kühlschrank auf, frieren Sie es nicht ein.
- + Belassen Sie Takhzyro in dem **Umkarton**, um die Fertigspritze vor Licht zu schützen.
- + Nehmen Sie die Takhzyro-Fertigspritze **15–30 Minuten vor der Anwendung aus dem Kühlschrank**, damit das Medikament Raumtemperatur erreichen kann und schütteln Sie es nicht.
- + Verwenden Sie Takhzyro **innerhalb von 14 Tagen** nach der Entnahme aus dem Kühlschrank. Bitte beachten Sie, dass innerhalb dieser Zeit die Fertigspritze unterhalb von 25 °C aufbewahrt werden muss. Legen Sie Takhzyro nach der Aufbewahrung bei Raumtemperatur nicht wieder in den Kühlschrank.
- + Bewahren Sie Takhzyro außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

*Nur im Rahmen einer Takhzyro-Verordnung zur Abgabe an Patient*innen*

Ihnen wurde zur Behandlung des Hereditären Angioödems Takhyro verschrieben. Verwenden Sie Takhyro erst, nachdem Ihnen die Anwendung von Ihrem Arzt / Ihrer Ärztin oder dem medizinischen Fachpersonal gezeigt worden ist und lesen Sie bitte vor Gebrauch die Packungsbeilage, dort finden Sie auch Informationen zur Art der Anwendung und zur Sicherheit des Arzneimittels. Falls Sie irgendwann Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt / Ihre Ärztin, Apotheker*in oder das medizinische Fachpersonal. Sie können sich auch gerne jederzeit an Takeda wenden, die Kontaktdaten finden Sie am Ende des Abschnitts 6 der Packungsbeilage oder Sie wenden sich per E-Mail an: medinfoEMEA@takeda.com. Die bereitgestellten Informationen stellen keinen Ersatz für eine medizinische Beratung dar.

Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können dabei helfen, indem Sie jede auftretende Nebenwirkung melden. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt / Ihre Ärztin, Apotheker*in oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in der Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: <http://www.bfarm.de>, anzeigen.



Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG
Potsdamer Str. 125
10783 Berlin
www.takeda.de